



网 址：www.lhpharma.com
传真号码：0514-87815079
电话号码：0514-87814842
邮政编码：225127

药品上市许可持有人及生产企业名称：江苏联环药业股份有限公司
药品上市许可持有人及生产企业地址：江苏省扬州市扬州生物健康

【执行标准】WS- (X-022)-2007Z
【有效期】24个月。
板，每板6粒。

1. 铝塑(药品包装用铝塑，聚氧乙烯固体药用硬片)包装，每盒1板，
每板6粒。
2. 双塑(果氧乙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合硬片)包装，每盒1

【包装】密封，避光，密封，阴凉处保存，不超过20℃。

【不良反应】手、手指疼痛或麻木、无可靠实验室证据。
产生直接抑制作用。
生成素的外泌和释放，并通过与生殖激素受体结合，在性腺器官部位

【注意事项】

1. 诊断不明原因的异常出血患者。
2. 肝、肾、心功能明显损害患者。
3. 孕妇及哺乳期妇女。
4. 哮喘症患者。
5. 血栓病患者。
6. 雄激素依赖性肿瘤患者。

【禁忌】下列患者禁用本品：

白、性激素结合球蛋白。
健康、甲状腺结合蛋白。

能损害，故口服治疗。
有报道每天400mg或更高剂量，引起血清转氨酶升高或黄疸性肝功
神和情绪不安已有报道。
潮红、出汗、阴道干燥、刺激感和乳房减小、反映雌激素下降。精
水和情绪不安已有报道。
水肿、脱发、声音改变，如音调和嘶哑、不稳定、低沉，停药后可持续。
阴道增生罕见。其它可能的副作用有：包括月经周期改变，痛经、经
雌激素作用：包括体重增加、痤疮、皮脂溢出、轻度的多毛症。
口服制剂有如下不良反应：
【不良反应】除有外周循环或轻度体重增加。

【规格】50mg。
【用法用量】阴道给药，每次1粒，每日1~2次，月经期停用3~4